

平成30年4月12日合意

処遇担当・入所担当・診療室

被収容者の健康状態把握に係る当面の取り決め（改正）

1 健康診断対象者

平成30年3月5日付け法務省管警第46号法務省入国管理局長発出の「被収容者の健康状態及び動静把握の徹底について（指示）」に基づき、健康診断対象者は、数日中に出国が予定されている場合を除き、以下の新規入所者とする。

- （1）喫煙歴・飲酒歴があつて高血圧と認められる者
- （2）本人に心疾患（心筋梗塞等）・脳疾患の既往歴がある者
- （3）家族に心疾患（心筋梗塞等）・脳疾患の既往歴がある者
- （4）過去の刑事罰歴等に鑑み、規制薬物（麻薬等）の使用歴がある者
- （5）移収元地方入国管理官署又は刑事収容施設等から治療・投薬の引継ぎがあつた者

2 当支局における対応

- （1）入所手続担当職員（以下「入所担当」という。）は、新規入所者の入所手続を行うに当たり、平成30年2月27日付け法務省管警第41号により改正された新たな「健康状態に関する質問書」を用いて健康状態を確認し、前記1のいずれかに該当する場合、その症状等を詳細に聴取のうえ同質問書を作成し、看護師に助言を求める。
- （2）入所担当は、看護師により診療の必要性があると判断された時は、看守責任者及び見張室の看守勤務者に口頭で報告する。
- （3）報告を受けた看守責任者及び見張室の看守勤務者は、出国予定等を勘案の上、直近の庁内診療を受診させる対象者として、診療日までの間、確実に申し送る。

3 救急常備薬の使用

被収容者に救急常備薬を使用させる際は、定められた服用期間を超えて服用させることがないように、一定期間使用しても症状が良くならない場合は、医師又は看護師に助言を求める。

添付物

- | | |
|-----------------|----|
| 1 救急常備薬一覧表（内服薬） | 1部 |
| 2 救急常備薬一覧表（外用薬） | 1部 |

薬名	主な効能・効果	用法・用量(15歳以上)	使用上の注意(服用不可)	医師に要相談(欄外※以外)	
ノーシン	頭痛・歯痛・解熱	1日3回、1回1包 服用間隔4時間以上	本剤でアレルギー症状起こした者、解熱鎮痛薬・風邪薬服用して喘息起こした者 他の解熱鎮痛薬、風邪薬、鎮静薬	心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍 5～6回服用しても症状がよくなる場合は説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談	★
パファリンA	頭痛	1日2回、1回2錠 服用間隔6時間以上	本剤でアレルギー症状起こした者、解熱鎮痛薬・風邪薬服用して喘息起こした者 他の解熱鎮痛薬、風邪薬、鎮静薬。ボックス引継より、血圧上200超える者。	同上 5～6回服用しても症状がよくなる場合は説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談	★
パブロンSゴールドW	風邪(喉の痛み・咳・鼻水)	1日3回、1回1包	本剤及び鶏卵によるアレルギー症状起こした者、解熱鎮痛薬・風邪薬服用して喘息起こした者 他の風邪薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含む内服薬	高熱、排尿困難、高血圧、糖尿病、心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍、甲状腺機能障害 5～6回服用しても症状がよくなる場合は説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談	★
新ルルA錠	風邪(鼻水・喉痛・発熱)	1日3回、1回3錠 6～10歳は1回1錠 11～14歳は1回2錠	本剤及び鶏卵による発疹・痒み等起こした者、解熱鎮痛薬・風邪薬服用して喘息起こした者 他の風邪薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含む内服薬	授乳中。高熱、排尿困難、高血圧、糖尿病、心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、甲状腺機能障害 5～6回服用しても症状がよくなる場合は説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談	★
アスクロン	喘息・咳・たん	1日3回、1回1包	他の鎮咳去痰薬、風邪薬、抗ヒスタミン剤を含む内服薬	高熱、排尿困難、高血圧、糖尿病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害 5～6回服用しても症状がよくなる場合は、説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談	★
キャベジンコーワS	胃痛・胃もたれ・胃部不快感	1日3回、1回2錠	他の胃腸鎮痛鎮痙薬、授乳中の者	排尿困難、心臓病、腎臓病、緑内障 2週間位服用しても症状がよくなる場合は説明書を持って医師、薬剤師に相談	★
新三共胃腸薬	食べ過ぎ・胸やけ・消化不良	1日3回、1回1包	透析療法を受けている者	腎臓病 2週間位服用しても症状がよくなる場合は、説明書を持って医師又は薬剤師に相談	★
パンシロン	胸やけ、胃痛、胃酸過多、げっぷ、飲み過ぎ、はきけ、嘔吐、食べ過ぎ、胃もたれ、胃部腹部膨満感	1日3回、1回1包	胃腸鎮痛鎮痙薬	排尿困難、腎臓病、心臓病、緑内障、甲状腺機能障害 2週間位服用しても症状がよくなる場合は、説明書を持って医師、薬剤師又は販売登録者に相談	★
ピオフェルミンS錠	整腸	1日3回、1回3錠		1か月位服用しても症状がよくなる場合は、説明書を持って医師または薬剤師に相談	★
コーラック	便秘	1日1回2錠 就寝前又は排便期待時間前服用	他の下剤。牛乳飲んでから1時間以内の服用は効果なし	激しい腹痛、悪心(胃がムカムカして吐気をもよおす)・嘔吐 1週間位服用しても症状がよくなる場合は説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談	★
正露丸	下痢・虫歯痛	1日3回、1回3錠	本剤でアレルギー症状起こした人、他の下痢止め薬	下痢、血便・粘膜便、腹痛、腹部膨満 ①数日間(目安として5～6日間)服用しても症状がよくなる場合は説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は販売登録者に相談②虫歯痛に1、2度使用しても痛みが取れない場合は説明書を持って歯科医師に相談	★
命の母	更年期障害・生理不順・めまい	1日3回、1回4錠	授乳中の者	しばらく服用しても症状がよくなる場合は、説明書をもって医師又は薬剤師に相談	★
アレルギール錠	皮膚の痒み・湿疹・鼻炎	1日2～3回、1回3錠	他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含む内服薬	むくみ・排尿困難・心臓病・高血圧・腎臓病・緑内障 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は説明書を持って医師又は薬剤師に相談	★
救心	動悸・息切れ	1日3回、1回2錠	他の強心薬	5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談(副作用の可能性があるので、発疹やおう吐を催したときも)	★
パンセダン	いらいら感、緊張感、興奮感の鎮静 頭痛、歯痛、倦怠感の緩和	1日2回、1回2錠	他の鎮静薬	5～6日間服用しても症状がよくなる場合は説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談	★
ホスロール	心身疲労による不眠	1日3回、1回1包		胃腸が弱い・下痢・下痢傾向 1週間位服用しても症状がよくなる場合において、長期連用する場合は医師又は薬剤師に相談	★
ドリエル	一時的な不眠	1日1回2錠、就寝前	妊婦、授乳中の者、日常的な不眠、不眠症 他の催眠鎮静薬、風邪薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミンを含む内服薬	排尿困難、緑内障、前立腺肥大 2～3日服用しても症状がよくなる場合は、説明書を持って医師、薬剤師又は販売登録者に相談	★

※ 服用前、医師に相談(全内服薬)

医師または歯科医師の治療を受けている者
妊婦または妊娠の可能性ある者
高齢者
本人や家族がアレルギー体質
薬によるアレルギー症状起こしたことがある者

※ 服用後、医師に相談

服用後、異常(アレルギー症状・症状悪化等)みられた者
継続服用しても症状改善しない者

※他の常備薬・処方薬と併用する場合、必ず併用可否確認。
※特に注意するものには、「黄色」で色付けてます。

救急常備薬一覧表(外用薬)

	薬名	主な効能・効果	用量・用法	使用上の注意(欄外※以外で)	
目薬	アイリスα	ものもらい・結膜炎	1日3～6回, 1回2～3滴	3～4日間服用しても症状がよくなる場合 は、説明書を持って医師・薬剤師登録販売者に相談	★
	アイリスCL	ドライアイ・目の疲れ	1日3～6回, 1回2～3滴	2週間位服用しても症状がよくなる場合 は、説明書を持って医師・薬剤師登録販売者に相談	★
軟膏	オイラックスA	かゆみ・かぶれ・湿疹・虫さされ	1日1～3回適量	5～6日間使用しても症状がよくなる場合 は説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売 者に相談	★
	レスタミンコーワ軟膏	湿疹・皮膚炎	1日数回適量	化膿している患部使用不可 5～6日間服用し ても症状がよくなる場合は説明書を持って 医師、薬剤師又は登録販売者に相談	★
	キップバイロルーHi	軽い火傷・日焼け・切り傷	適量	数日間使用しても症状の改善がみられない場 合は使用を中止し、説明書を持って医師又 は、薬剤師に相談。	★
	吸出し青膏 (たこの吸い出し)	化膿性皮膚疾患 腫れものの吸い出し	適量	軟膏をガーゼに塗り、患部に貼付。膿が出る までは1日2回貼り替え。目、湿疹及び外傷の ある部分への使用不可。5～6日間使用しても 症状がよくなる場合は使用を中止し説明 書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談。	★
	バンテリンコーワ1.0%ゲル	筋肉痛・肩の痛み・腰痛・関節痛	1日4回適量	本剤でアレルギー・症状起こした者使用不可 喘息起こした者使用不可。5～6日間服用して も症状がよくなる場合は服用を中止し説 明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に 相談	★
	プリザS軟膏	痔の痛み・出血・はれ・かゆみ	1日1～3回肛門部適量	患部が化膿している者使用不可 10日間位使用しても症状がよくなる場合 は説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売 者に相談	★
	ワセリン(白色ワセリン)	皮膚・口唇の保護、乾燥を防ぐ	特に記載なし、薄くこまめに塗りなおす	傷、湿疹、口角炎等の異常があるときは控え る。皮膚に異常が現れたら使用を中止し、皮 膚科へ相談。	★
	フルコート	湿疹・皮膚炎・あせも・かぶれ じんましん・とびひ	1日1～数回適量患部に塗布	本剤、抗生物質及び副腎皮質でアレルギー一 症状起こした者使用不可。水疱瘡、いんきん、た むし及び目への使用不可。長期連用不可。5 ～6日間使用しても症状がよくなる場合は 使用を中止し説明書を持って医師、薬剤師又 は登録販売者に相談。	★
	オロナインH軟膏	にきび・吹出物・火傷・しもやけ・傷	適量	綿棒に塗布して使用。湿疹・虫さされ使用不可 5～6日間服用しても症状がよくなる場合 は、説明書を持って医師、薬剤師又は登録販 売者に相談	★
	新デスパコーワ	口内炎・歯茎の腫れ	口内炎1日2～4回, 歯肉炎・歯槽膿漏1日2回	なし	★
歯痛	ヴィックス・ヴェボラップ	鼻づまり・くしゃみ緩和	1日3回適量	7日間使用しても症状が良くならない場合は、 説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者 に相談	★
	今治水	虫歯・歯痛	適量	薬剤を染み込ませた綿球を虫歯の穴に入れる 歯茎・唇使用不可 5～6回使用しても症状の 改善がみられない場合は、説明書を持って医 師、歯科医師又は薬剤師に相談	★
	イソジンうがい薬	喉の殺菌・消毒	1日数回, 1回2～4mlを水60mlで薄める	薬剤でアレルギー一症状起こした者使用不可。 5～6日間使用しても症状がよくなる場合 は、使用を中止し、説明書を持って医師、薬剤 師又は登録販売者に相談。	★
喉痛	アズノール	口腔・咽喉のはれ、口腔内の洗浄	1日数回, 1回10～13滴を水100mlで薄める	薬剤でアレルギー一症状起こした者使用不可。 5～6日間使用しても症状がよくなる場合 は、使用を中止し、説明書を持って医師、歯科 医、薬剤師又は登録販売者に相談。	★
	コルゲンコーワトローチ	喉の痛み・はれ	1日4～5回, 1回1個	本剤及び鶏卵によるアレルギー一症状起こし た者使用不可 口の中でゆっくり溶かす 5～6回使用しても 症状の改善がみられない場合は、説明書を持 って医師、歯科医師又は薬剤師に相談	★
	ブリーズライト	鼻の詰まり・いびき	1日1回1枚	鼻孔に貼付。皮膚に異常があるときは使用不 可。貼付部の皮膚に異常が出た場合は、皮膚 科に相談。	★
湿布	サロンパスA	肩こり・腰痛・筋肉痛	1日数回適量	目の周囲・粘膜・湿疹・かぶれ・傷口に使用不 可。5～6日間使用しても症状がよくなる場合 は、使用を中止し、説明書を持って医師、 薬剤師又は登録販売者に相談。	★
	ハリックス55 冷感	肩こり・腰痛・筋肉痛・関節痛	1日1～2回適量	目の周囲、粘膜、湿疹、傷口等使用不可。5 ～6日間使用しても症状がよくなる場合 は、説明書を持って医師、薬剤師又は登録販 売者に相談	★
	ハリックス55 温感	腰痛・肩こり・関節痛・筋肉痛	1日1～2回適量	目の周囲、粘膜、湿疹、傷口等使用不可。5 ～6日間使用しても症状がよくなる場合 は、説明書を持って医師、薬剤師又は登録販 売者に相談	★
	冷えピタ	頭痛・歯痛・眠気冷まし	特に記載なし	冷却効果は8時間。皮膚に異常が現れたら、 皮膚科医に相談。	★
浣腸	イチジク浣腸	便秘	1日1回1個 (効果ないときは、もう1個投与)	投与後、便意が強まるまで我慢(すぐトイレに 行くと薬剤成分のみ排出される)。連用しな い。2～3回使用しても排便がない場合は、使 用を中止し、説明書を持って医師、薬剤師又 は登録販売者に相談	★
坐薬	プリザS坐薬	痔の痛み・腫れ・出血・かゆみ	1日3回まで, 1回1個肛門部, 冷蔵庫保管	本剤でアレルギー一症状起こした者使用不可 患部が化膿している場合、使用不可 10日位 使用しても症状がよくなる場合は、説明書 を持って医師又は薬剤師に相談	★

※ 投与用前、医師に相談(全外用薬)
妊婦または妊娠の可能性ある者
本人や家族がアレルギー体質
薬によるアレルギー一症状起こしたことがある者

※他の常備薬・処方薬と併用する場合、必ず併用可否確認。
※特に注意するものには、「黄色」で色付けしてます。

※ 使用後、医師に相談
投与後、異常(アレルギー一症状・症状悪化等)みられた者